

71. **Pleurothallis Cogniauxiana** Schlechter, nov. spec.

Planta verosimiliter habitu *P. saurocephalae* Ldl.; caulibus compressis, validiusculis; folio ovato vel ovato-oblongo, cordato, acuto vel acuminato crasse-coriaceo, glabro, 9—11 cm longo, infra medium 4,5—6 cm lato; spicis singulis vel paucis basi vaginis paucis protectis, usque supra basin laxe plurifloris, folii dimidium vulgo haud excedentibus; bracteis ovato-cucullatis acuminatis, glabris, ovarium paulo excedentibus vel aequilongis; floribus illis *P. saurocephalae* fere aequimagnis, ut videtur purpureo-pictis; sepalis oblongo-ligulatis obtusis, glabris, haud connatis, textura carnosulis, intermedio c. 1 cm longo, lateralibus subfalcato-incurvulis 0,8 cm longis; petalis oblique rhomboideis, acuminatis, glabris, margine irregularibus subundulatis, textura sepalis tenuioribus, 0,4 cm longis, medio fere 0,2 cm latis; labello petalis aequimagno breviter unguiculato, circuitu rhomboideo-oblongo, obscure trilobato, basi cordato-auriculato, superne lamellis 2 cristatis e basi usque supra medium decurrentibus ornato, dimidio anteriore subinconspicue puberulo; columna gracili curvata, glabra, clinandrio ampliato margine lacerato-denticulato, dorso acuto; anthera alticucullata, antice truncata, dorso leviter puberulo; ovario cylindraceo, minute puberulo c. 0,3 cm longo.

Costa-Rica: Zwischen La Palma und Curillo — Herb. Instit. costaricens. no. 2467.

Von dieser Art liegen leider keine Rhizome vor, so dass sich nicht mit Sicherheit entscheiden lässt, ob die Stämmchen dicht gedrängt oder in Abständen stehen.