

Campylocentrum parvulum Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, erectum, parvulum, caulescens, ad 7 cm altum; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caule simplici, bene foliato, vaginis foliorum striatis, mox minute rugulosis obtecto, tereti, glabro, c. 2,5 mm diametente; foliis patentibus oblongo-ligulatis, obtusis, basin versus paulo angustatis, tenuius coriaceis, 1—1,3 cm longis, medio fere ad 4 mm latis; inflorescentiis patentibus, folia paulo excedentibus, pedunculo 6—8 mm longo paucivaginulato, racemo ipso ad 1 cm longo, rhachi puberulo, distiche pluri- ad 12-floro; bracteis subpatentibus, deltoideis, acutis, ovario brevioribus; floribus in genere inter minimos, ut videtur albidis, glabris vel subglabris; sepalis lanceolato-oblongis, obtusiusculis, extus nervo mediano leviter carinatis, vix 1 mm longitudine excedentibus, lateralibus obliquis; petalis quam sepala bene similibus et subaequilongis, obliquis; labello circuitu ovato, petalis aequilongo, e medio fere trilobato, 3-nervio, lobis lateralibus obtusatis, brevibus, intermedio antico oblongo-ovato, obtuso, calcare cylindraceo, obtuso, recto, ovarium aequante; columna generis, perbrevi, crassiuscula, glabra; ovario cylindraceo, glabro, vix 1 mm longo, subglabro vel minute et sparsim papilloso.

Costa Rica: La Palma, 1400 m ü. M. — A. u. C. Brade no. 1294, blühend im Juni 1910.

Die kleinste mir bis jetzt bekanntgewordene Art aus der Verwandtschaft des *C. Schiedei* Bth., von dem sie nicht nur durch die schlankere Tracht, sondern auch durch kleinere Blüten und den kurzen geraden Sporn unterschieden ist, auch die Form der Lippenplatte ist bei der neuen Art durch den breiteren Vorderlappen charakteristisch.