

12. *Masdevallia trinemoides* Kränzl., n. sp. — Caules et folia desunt. Scapi pro planta tenues, circ. 10 ad 12 cm longi, vaginulis 1 vel 2 obsiti, teretes vel obscure angulati, flores pauci succedanei, bractae oblongae, acutae, carinatae, acuminatae, 1,5 cm longae, virides, pedicellos cum ovariis haud plane aequantes, paulo tantum breviores. Cupula sepalorum propria nulla, sepalum dorsale obovato-oblongum, 1,8 cm longum, 8 mm latum, acutum, in caudam filiformem, 3 cm longam subito attenuatum, sepala lateralia basi tantum connata, oblongo-lanceolata marginibus revolutis ideoque angustiora visa, acuminata, 1,8 cm longa, 4 mm lata, in caudas filiformes 2,5 cm longas attenuata, haec omnia extus glabra, sicca obscure purpurea, intus et margine sparsim papillosa, sepalum dorsale basin versus pallidius purpureo-punctatum. Petala e basi angusta oblonga, leviter flexa, utrinque subrepanda, apice oblique et irregulariter bilobula, ad 8 mm longa, 3 mm lata. Labellum brevissime unguiculatum, panduratum, basi latius quam antice, ibi rotundatum, margine antico leviter inflexum, labellum tamen minime sacculatum dicendum, lamellis minutissimis semilunatis vel falcatis medio in disco pone marginem sinus, lineae parallelae 3 a basi apicem usque decurrentes, antice altiores, totum labellum 1 cm longum, basi 5 mm, antice 4 mm latum, purpureum vel pallidius, purpureo-punctatum. Gynostemium generis albidum, apice acutum, 8 mm longum.

Colombien. Prov. Antioquia (G. Schmidtchen! — Sammler für F. Sander in St. Albans-Herts).

Eine stark verkleinerte Ausgabe von *M. trinema* Reichb. f., aber auch sonst durch die ganz anders gestalteten Petalen und das keineswegs sackförmige Labellum unterschieden. Das Exemplar (3 Blüten und 1 Knospe) machte den Eindruck eines Notizbuchexemplars, welches gelegentlich abgepflückt und zur Ansicht an F. Sander eingesandt war. Trotz mancher Abweichungen doch zu den *Saccilabiatae* zu rechnen.