

E. chlorocorymbos Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, patulum, usque ad 30 cm longum; rhizomate valde abbreviato; caulibus simplicibus, c. 8—10 foliatis, flexuosis, teretibus, vaginis foliorum persistentibus, striato-nervosis, omnino obtectis, usque ad 25 cm longis, c. 4 mm diametro; foliis subpatentibus, oblongo-ligulatis, obtusis, medianis usque ad 6,5 cm longis, medio fere usque ad 1,4 cm latis, coriaceis; inflorescentia terminali, brevissime pedunculata, umbelliformi-abbreviata, 5—10-flora; bracteis lanceolatis, acuminatis, ovario pedicellato multo brevioribus; floribus in genere mediocribus, illis *E. difformis* Sw. similibus, sed paulo majoribus, laete viridibus, glabris; sepalis oblongo-ligulatis, obtusiusculis, supra medium leviter dilatatis, 1,8 cm longis, lateralibus obliquis, subacutis vel subacuminatis; petalis e basi anguste lineari apicem versus paululo dilatatis, obtusiusculis, uninnerviis, obliquis, quam sepala aequilongis; labelli ungue lineari, 1,3 cm longo, marginibus columnae omnino adnato, lamina perlate reniformi, basi cordata, antice lobulis 2 brevibus, semiorbicularibus donata, excisa, basi callis 2 brevibus leviter curvatis ornata, 7,5 mm longa, infra medium 2 cm lata; columna recta, apicem versus paululo dilatata, lobis lateralibus leviter productis, 1,3 cm longa; ovario cum pedicello gracili, papilloso-asperato, c. 4 cm longo.

Panama: Am Gatun-See, unweit Panama-City — no. 82.

Wahrscheinlich ist diese Pflanze oft für *E. difforme* Sw. gehalten worden. Sie ist aber spezifisch gut von ihr getrennt durch die Form der Lippe und das papillösraue Ovarium.

Die Blüten sind nach Angabe von Mr. Powell „erbsengrün“.