

Epidendrum urostachyum Schltr. n. sp.

Epiphyticum, c. 30 cm altum; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulis simplicibus dimidio superiore fere 4-foliatis, vaginis (superioribus foliatis) arcte amplectentibus omnino vestitis, c. 4 mm diametentibus; foliis erecto-patentibus, linear-lanceolatis, acutis, 11—17 cm longis, infra medium 6—11 mm latis, coriaceis; vaginis apicalibus fere 3 alte vaginantibus acutis mox desiccatibus; racemo arcuato-pendulo, elongato, dense multifloro, ad 13 cm longo, pedunculo nudo c. 4 cm longo; bracteis lanceolatis, acuminatis, ovarium subaequantibus; floribus parvulis, illis *E. dolichostachyi* Schltr. similibus, sed multo minoribus, glabris; sepalis oblongis, acutis, c. 3,5 mm longis, lateralibus obliquis, basin versus margine anteriore paulo angustatis; petalis oblique linearibus, subacutis, glabris, 3 mm longis; labello e ungue linear, columnae omnino adnato, 1,5 mm longo, in laminam orbicularem, margine undulatam, flabellato-plicatam, medio callo semilunato ornatam cum gibbo oblongo anteposito, apice brevissime excisam, 1,5 mm diametentem expanso; columna brevi, 1,5 mm longa, apicem versus ampliata, apice 5-lobulata; ovario cum pedicello gracili glabro, c. 3 mm longo.

Costa Rica: El Tablazo, près San José, 1900 m. —
Emel Jimenez (n. 17651 herb. Nac. Costa Rica), Sept. 1913.

Die Art steht dem *E. Laueanum* Rolfe und *E. dolichostachyum* Schltr. nahe, ist aber gut unterschieden durch die bedeutend kleineren Blüten und die Gestalt des Labellums.