

E. verecundum Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, ut videtur e basi ramosum, curvatum vel subpensile, ad 15 cm longum; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulis ramosis, in parte basali vaginatis, caeterum satis dense foliatis, vaginis foliorum arctissime amplectentibus, persistentibus, striato-rugulosis, paulo compressis omnino obtectis, 3—3,5 mm latis; foliis patentibus, lanceolato-ligulatis, obtusiusculis vel subacuteis, in sectione haud valde coriaceis, 2,5—3,5 cm longis, infra medium 6—10 mm latis; racemis more sectionis terminalibus, sessilibus vel subsessilibus, distichis, sublaxe vel subdense 4—7-floris, usque ad 2,3 cm longis; bracteis et vaginis in ima basi pedunculi foliaceis, compressis, obtusiusculis, bracteis sparsim squamulosis, ovarium paulo vel tertia parte superantibus; floribus parvulis, illis *E. strobilifera* Rehb. f. similibus et fere aequimagnis, fide collectoris albis, glabris, carnosis; sepalis oblongo-ligulatis, obtusis vel obtusiusculis, nervo mediano extus carinato-incrassatis, 5 mm longis, lateribus sublanceolatis, obliquis; petalis linearis-ligulatis, obtusiusculis, 3-nerviis, obliquis, quam sepala fere aequilongis; labelli ungue linearis, columnae marginibus omnino adnato, c. 2 mm longo, lamina ovato-cordata, acuta, basi incrassatione triangulari antice evanescente donata, 3 mm longa, supra basin c. 2,25 mm lata; columna recta, apicem versus sensim paulo dilatata, lobis lateralibus juxta apicem falcato-triangulis, acutis, satis magnis; ovario antice vesicato-funiculato, pedicello brevi inclusu c. 5 mm longo, sparsim et minute furfuraceo.

Panama: Auf Hügeln bei Panama-City — no. 209.

Unsere Pflanze steht dem *E. strobilifera* Rehb. f. aus Guyana recht nahe, ist äußerlich aber durch dünnerne, durchschnittlich längere Blätter und lockerere Blütentrauben mit weniger Blüten charakterisiert. Außerdem sind die Blütenteile, vor allen Dingen das Labellum, in ihrer Form abweichend.

Die Blütenfärbung gibt Mr. Powell als „weiß“ an.