

Gongora Amparoana Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, habitu verosimiliter *G. cassideae* Rehb. f., pseudo-bulbis foliisque nondum notis; inflorescentia pendula, pergracili, pedunculo paucivaginulato, usque ad 12 cm longo, racemo laxo 5—10-floro; bracteis lanceolatis, acuminatis, ovario pedicellato multo brevioribus; floribus patentibus apice incurvis, illis *G. cassideae* Rehb. f. similibus, glabris; sepalis subpatentibus, ellipticis, apiculatis, c. 2 cm longis, intermedio valde concavo, basi columnae dorso adnato, lateralibus valde obliquis; petalis sigmoideo-lanceolatis acuminatissimis, lateribus columnae basi adnatis et decurrentibus, 5-nerviis, longitudine columnam fere aequantibus; labelli ungue breviter lineari, 6 mm longo, hypochilii lobis retrorsis, oblique quadrato-oblongis, antice decrescentibus, e medio fere conjunctis, antice in dentem parvulum in utroque latere labelli exeuntibus, hypochilio toto a basi usque ad apicem 6 mm longo, lobis c. 6 mm altis, epichilo erecto, canaliculato, apice paulo dilatato bilobato-exciso cum apiculo interjecto, 7 mm longo; columna apicem versus bene dilatata, 7 mm longa, pede 6 mm longo; ovario incurvulo, gracili cum pedicello c. 3,8 cm longo.

Costa Rica: Im Garten der Mdme. Amparo de Zeledon, San José, 1100 m — A. Tonduz no. 55, im Jahre 1920.

Die Art ist mit *G. cassidea* Rehb. f. verwandt, hat aber kleinere Blüten und ein nur ausgeschnittenes, nicht tief zweispaltiges Epichil.