


En 1984, propuse el género *Hirtzia* basado en la especie *H. benzingii*. La especie ha resultado ser bastante común en el Ecuador en ambos flancos de los Andes en alturas entre 1400 y 1800 metros. Mas tarde, descubrimos que también era común cerca de Sibundoy en el Putumayo, sureste de Colombia.

En septiembre de 1984, durante un viaje a Medellín, recolectamos cerca de La Unión varias plantas de otra especie del mismo género en la cual el hábito y las flores son muy similares a *H. benzingii*, pero las hojas son articuladas en la base.


Existe una tercera especie en el Perú, recolectada por el recién fallecido Al Gentry, pero no ha sido descrita todavía.

In 1984, I proposed the genus *Hirtzia* based on the species *H. benzingii*. The species has proven to be quite common on both sides of the Andes in Ecuador at elevations from 1400 to 1800 meters. We later found the same species to be common near Sibundoy, Putumayo, in southeastern Colombia.

In September of 1984, during a trip to Medellín, we collected several plants near La Unión of another species from the same genus in which the plant



HIRTZIA ESCOBARII Dodson



HIRTZIA ESCOBARII

Dodson

Fotografía: Jorge Mario Múnera

***HIRTZIA ESCOBARII* Dodson, sp. nov.**

Similis *Hirtziae benzingii* Dodson, a qua distinguitur foliis articulatis et labello pandurato ornato callo pandurato.

TIPO: COLOMBIA: ANTIOQUIA: Municipio de La Unión: km 17, road from La Unión to Abejorral, 2450 m, 9 September 1984, C. & P. Dodson, R. Escobar, L. C. & A. Vieira 15258A (RPSC holotype).

ETIMOLOGIA: Nombrada en honor del Sr. Rodrigo Escobar R. de Medellín, Colombia, quién participó en la primera recolección de la especie y ha contribuido en forma notable al conocimiento de las orquídeas de Colombia y Ecuador

ETYMOLOGY: Named in honor of Sr. Rodrigo Escobar R. of Medellín, Colombia who participated in the first collection of the species and has made a major contribution to knowledge of the orchids of Colombia and Ecuador.

Epiphytic on outer twigs in small trees. Stems short; pseudobulbs lacking. Leaves equitant, conduplicate, oblique, to 3.5 x 0.5 cm, acute at the apex. Inflorescences from the axils of the upper leaves, to 4 cm long; 2-to 4-flowered; floral bracts triangular, to 1 mm long; ovary pedicellate, wingless, to 5 mm long. Sepals and petals erect; sepals green-white; petals and

lip white; lip with red on callus; anther cap red. Dorsal sepal ovate-triangular, obtuse at the apex, free, to 5.8 x 3 mm; lateral sepals united for more than 2/3 their length, the apices curved upwards around the apex of the lip; petals oblong-falcate, obtuse at the apex, to 6 x 1.8 mm; lip pandurate, lobed on each side at the base and toward the apex, concave in front of the callus, to 6 x 3 mm, the callus a fleshy, pandurate pad; column slightly flattened dorsoventrally, to 5 mm long, the apex with a pair of porrect, oblong wings, retuse at the apex, to 1.5 mm long, surrounding the stigma; the rostellum bifid, erect; anther dorsal; pollinia 2, hard, on a clavate stipe attached to a tiny viscidium.

NOTAS: La especie se distingue de *H. benzingii* Dodson por las hojas articuladas y el labelo pandurado, con los lóbulos apicales más anchos que los basales y el callo comprimido en el centro, lo que le da una forma pandurada.

Es increíble que miembros de un género tan ampliamente distribuido como este no se hubieran descubierto desde hace mucho tiempo. Las plantas frecuentemente son comunes localmente en sus hábitats en bosques húmedos entre 1500 y 2500 metros. En su habito las plantas se ven similares a las del género *Ornithocephalus* pero con flores que se parecen a las del género *Leochilus*.

NOTES: The species is distinguished from *H. benzingii* Dodson by the articulated leaves and the pandurate lip with the apical lobes wider than the basal lobes, and the callus constricted in the middle to achieve a pandurate form. It seems incredible that the members of this widely distributed genus were not discovered long ago. The plants often are locally common in their natural habitat in wet cloud forest from 1500 to 2500 meters. They appear very similar in growth habit to members of the genus *Ornithocephalus* but with flowers that resemble those of the genus *Leochilus*.