

Kefersteinia Rchb. f.

Kefersteinia parvilabris Schltr., nov. spec.

Epiphytica, acaulis, erecta, c. 13 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; foliis in quoque surculo 4—6, distichis, oblanceolatis, conspicue acuminatis, basin versus sensim petioliformi-angustatis, usque ad 12 cm longis, supra medium usque ad 1,9 cm latis; inflorescentiis ex axillis foliorum singulis, gracilibus, adscendentibus, unifloris, pedunculo pergracili, vaginulis paucis dissitis ornato, usque ad 5 cm longo; bractea ovata, acuta, ovario pedicellato fere 4-plo breviore; flore in genere inter minores, glabro, ut videtur pallido, emaculato; sepalis subpatentibus oblongis, acutis, 5-nerviis, c. 1,2 cm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique oblongo-lanceolatis, acutis, 5-nerviis, quam sepala paulo angustioribus, 1,1 cm longis; labello circuitu obovato, obtuso, integro, supra basin margine latere utrinque in angulum vel dentem triangulum subacutum perbrevem producto, basi callo parvulo reniformi ornato, c. 1 cm longo, supra medium c. 7 mm longo, nervis 2 leviter in-crassatis, longitudinalibus ornato; columna semitereti, apicem versus leviter dilatata, c. 8 mm alta, clinandrii dorso satis alto; ovario pedicellato, gracili, glabro, c. 1,2 cm longo.

Costa Rica: San Jeronimo — C. Wercklé no. 116, im Jahre 1922.

Eine sehr charakteristische Art, die durch die verhältnismäßig kleine, auffallend schmale, am Rande vollkommen ungezähnelte Lippe charakterisiert ist. Offenbar sind die Blüten blaß gefärbt und ganz ungefleckt.

Leider ist das Blütenmaterial recht spärlich.