

266. **Lepanthes acuminata** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, pusilla, 4,5—6,5 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris; caulibus gracilibus, 5—8-vaginat, 2—5 cm longis; vaginis alte et arcte amplexantibus, ostio acuminato paulo dilatatis, pluricostatis, costis et margine ostii minute et dense ciliolatis; folio erecto vel erecto-patente lanceolato-elliptico vel ovato-lanceolato, obtusiusculo, apice minute exciso cum apiculo, 1,3—2,5 cm longo, infra medium 0,5—1 cm lato; racemo subaxe plurifloro, sensim paulo elongato, rarius dimidium folii excedente, pedunculo brevi; bracteis breviter acuminatis, pedicellum brevem paulo superantibus, minute et sparsim papillosis; floribus suberectis, inversis, glabris; sepalis ovato-lanceolatis, longe acuminatis, 0,6 cm longis, lateralibus obliquis, tertia parte basali connatis; petalis transverse bilobatis, inter apices loborum c. 0,2 cm latis, lobis late oblongis, obtusissimis, angulum obtusum formantibus; labello c. 1,25 mm longo, e basi cordata cum angulis obtusis antice late forcipato-bilobato, sinu lato obtusissimo, lobis lineari-falcatis, acutis; columna gracili, labellum distincte superante; ovario cum pedicello brevi glabro, vix 1,75 mm superante.

Guatemala: Epiphytisch im Bergwalde bei Coban, c. 1400 m ü. d. M. — H. v. Türckheim no. II, 1965, blühend im September 1907.

Diese kleine Art ist nahe verwandt mit *L. Lindleyana* Rehb. f., ist aber durch das verschiedene Labellum und meist schmalere Blätter kenntlich, ausserdem hat sie kahle Petalen von sehr charakteristischer Form.