

Lepanthes truncata Luer & Dressler, sp. nov.

Planta mediocris caespitosa, ramicaulibus debilibus plusminusve horizontalibus folio elliptico pendenti longioribus, inflorescentia congestissima folio brevioribus, sepalis late ovatis obtusis breviter pauciciliatis, petalis transverse bilobis, lobo superiore late truncato, labello bilaminato laminis ovatis glabris, appendice parva ciliata exteriori.

Planta de tamaño medio, epífita, cespitosa; raíces delgadas. "Ramicaules" delgados más o menos horizontales envueltos por 4 a 6 vainas leplantiformes apretadas, microscópicamente ciliadas. Hoja más o menos péndula, verde satinada, con manchas púrpura, coriácea, elíptica de 30 a 35 mm de largo por 18 a 25 mm de ancho, el ápice ligeramente acuminado, subagudo, la base también ligeramente acuminada, subaguda, subsésil, el pecíolo de cerca de 1 mm de largo. Inflorescencia racimosa, 1, o más comúnmente 2 ó 3 racimos de



Fotografía: Kerry Dressler

Lepanthes truncata

flores sucesivas muy apiñadas hasta de 10 mm de largo, sostenidas en la parte alta de la hoja por un pedúnculo filiforme de 7 a 17 mm de largo; brácteas florales espiculadas de 1 a 1.5 mm de largo; pedicelo de 2 a 2.5 mm de largo, ovario de 1.5 mm de largo; sépalos ligeramente amarillos, difusamente ciliados, espiculados a lo largo de las venas externas carinadas, ampliamente ovados, obtusos, el sépalo dorsal de 2.5 mm de largo por 2.4 mm de ancho, connato a los sépalos laterales por 0.5 mm, los sépalos laterales de 2.5 mm de largo por 2 mm de ancho, connatos 1 mm; pétalos de color naranja manchados de rojo en la parte media, bilobados de 0.5 mm de largo por 1.2 mm de ancho en el ápice, el lóbulo inferior más pequeño, oblongo, oblícuo, obtuso; el labelo de color púrpura oscuro, bilamelado,




Ilustración: Carlyle A. Luer

Lepanthes truncata

la lámina lisa ovada de 1 mm de largo, agudo en el ápice, redondeado en las bases, los conectivos oblongos por encima de la parte media, el apéndice pequeño redondeado, pubescente situado por fuera del seno obtuso; columna de 1 mm de largo, la antera y el estigma apicales.

ETIMOLOGIA: del Latín *truncatus*, "truncado" se refiere a los ápices de los lóbulos superiores de los pétalos ampliamente truncados.

TIPO: PANAMA: PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO: epífita en bosque húmedo entre Fortuna y Chiriquí Grande, alt. 350 m. 17 de febrero de 1985, C. Luer, J. Luer, R. L. Dressler y K. Dressler, 10618 (Holotipo: MO).

Esta especie fue descubierta en la misma rama con los precedentes *L. Arachnion* y *L. pantomima*. Las inflorescencias colocadas sobre las hojas satinadas comúnmente se producen en pares, uno corto y el otro del doble de largo, similar al hábito de *L. mucronata* Lindl. de Suramérica. La característica más distintiva de la flor son los ápices de los pétalos ampliamente truncados. (Fotografía de Kerry Dressler).