

389. **Lockhartia Pittieri** Schltr. nov. spec.

Epiphytica, 15—20 cm alta; caulibus simplicibus, dense foliatis; foliis equitantibus, subfalcato-lanceolatis, subacutis, 2—2,3 cm longis, basi 4—5 mm latis; inflorescentia apicali, more *L. Weigeltii* R. f. valde abbreviata, pauciflora; bracteis parvulis ovario bene brevioribus; floribus in genere inter mediocres, tenuibus, glabris; sepalis oblongis, acutis, 4—5 mm longis, lateralibus obliquis; petalis oblique ovalibus, obtusis, sepalis subaequilongis; labello circuitu oblongo-quadrato, e medio quadrilobo, c. 5,5 mm longo, medio fere 3,5 mm lato, lobis lateralibus brevibus, rotundatis, anticis bene longioribus, semioblongis, obtusis, callo ovato, obtuso, integro in basi labelli; columna brevi, alis brevibus subrhombeis, margine superiore subcrenulatis; ovario pedicellato, glabro, clavato, c. 6 mm longo.

Panama: Kultiviert in Culebra von Mrs. Rousseau, ursprünglich von Bohis stammend. — H. Pittier (B. S. P. C. Z., no. 3401), blühend im April 1911.

Die Art ist neben *L. pallida* R. f. unterzubringen, unterscheidet sich aber vor jener ganz erheblich durch die Infloreszenzen.

Die Blüten sind blassgelb.