

Maxillaria (Lycaste) brevispatha Kl.

Bracteis distantibus membranaceis, aridis, fuscescentibus, superne magis inflatis, brevissime acutis, suprema ovarium vix attingente; perianthii foliolis exterioribus oblongis, patentibus apice recurvis, pallide flavido-virescentibus, intus ad basin villosulis, interioribus candidis, basi roseo-tinctis sparsimque pilosis, apice recurvis; labello petalis brevior, albido, trilobo, glabro, laciniis lateralibus apice truncatis, intermedia oblonga, obtusa, recurva, appendice linguiformi concava adnata, inter lacinias laterales; germine brevi, subincurvo, minutissime atro-punctato. — (Calcar 4 lin. longus. Perianthii foliola exteriora 20 lin. longa, 10 lin. lata, interiora 18 lin. longa, 10 lin. lata. Gynostemium 10 lin. longum, subincurvum, antice planum, pilosum, dorso concavum, glabrum. Labellum 15 lin. longum. Bractee 8—9 lin. longae.) Guatemala. Warszewicz.

A *Maxillaria (Lycaste) leucantha Kl.* differt: bracteis ovario brevioribus, labello glabro, lobis lateralibus antice truncatis.

Befindet sich bei dem Fabrikbesitzer Herrn Nauen in Kultur.
