

Pescatorea costaricensis Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, c. 30—35 cm alta; rhizomate subnullo; radicibus filiformibus flexuosis, glabris; foliis 6—8 in quoque surculo, erecto-patentibus, anguste lanceolato-ligulatis, acuminatis, glabris, basin versus sensim paulo angustatis, usque ad 35 cm longis, medio fere 2,7—4,3 cm latis; inflorescentiis erectis, singulis, more generis unifloris; scapo paucivaginato, ad 7 cm longo; bractea ovali-cucullata, ovarium aequilongum amplectente; flore erecto, carnosulo; sepalis oblongis, obtusis, glabris, 3,7 cm longis, lateralibus obliquis; petalis obliquis, quam sepala similibus et fere aequimagnis; labello circuitu obovali, basi perbrevider unguiculato, in quarta parte basilari utrinque sublobulato-constricto, crista flabellata 13—15-crenulata e basi usque in quartam partem basilarem ornato, lamina minute papilloso-verruculosa, apice breviter excisa, labello toto c. 3 cm longo, medio fere 2,5 cm lato; columna semitereti, glabra, 2,2 cm longa, leviter arcuata; ovario sessili, cylindraceo, glabro, 1,2 cm longo.

Costa Rica: Ohne nähere Standortsangabe. — A. u. C. Brade no. 1196, im Mai 1910.

Leider fehlen Angaben über die Färbung der Blüten. Die Spezies dürfte mit *P. cerina* Rehb. f. von Panama am nächsten verwandt sein, unterscheidet sich aber durch die Form und Struktur der Lippe.