

Platystele bulbinella Schltr., nov. spec.

Epiphytica, pusilla, caespitosa, 7—10 em alta; rhizomate valde abbreviato, dense caulinibus obsesso; radicibus filiformibus flexuosis glabris 1—1,5 mm diametentibus; caulinibus brevibus cylindraceis, vagina hyalina mox decidua primum omnino vaginatis, 1,5—2,5 mm longis, crassitudine vix 0,5 mm excedentibus, apice unifoliatis; foliis erectis linear-ligulatis, obtusis, glabris, textura coriaceo-carnosulis, basin versus sensim in petiolum attenuatis, 2—4 cm longis, supra medium 1,5—2 mm latis; pedunculis singulis terminalibus; vaginulis 2—3 dissitis hyalinis, cucullato-amplectentibus, apiculatis obsessis, glabris, teretibus, vix 1 mm diametentibus; racemo cylindraceo elongato, densius multifloro, usque ad 4 cm longo; bracteis ovato-lanceolatis acuminatis, hyalinis, glabris, ovario pedicellato duplo brevioribus; floribus in tribu inter minores, perianthio hyalino nutante; sepalis oblongis obtusiusculis, 0,2 cm longis, medio fere 0,1 cm latis, lateralibus obliquis, subfalcatis; petalis subfalcatis, sepalis similibus aequimagnisque glabris; labello minuto subreniformi-orbiculari, apice breviter acuminato, glabro, basi lamellula subinconspicua transversa ornato; columna generis, stigmate transverse oblongo marginato; ovario pedicellato, tereti, glabro, pedicello inclusu 3,5—4 mm longo.

Costa-Rica: In den Wäldern des Rancho Flores, bei 2043 m ü. d. M.
— H. Pittier no. 2013, blühend im Februar 1890.

Die Blüten scheinen, wenn sie nicht befruchtet sind, ganz abgegliedert zu werden. Die kleinen Rasen machen mit ihren schmalen Blättern den Eindruck einer sehr kleinen *Bulbine*-Art, was noch durch die Gleichförmigkeit der Sepalen und Petalen und die nickenden Blüten bestärkt wird.