


Platystele orectoglossa P. Ortiz, sp. nov.

P antae parvae, caespitosae, epiphytaceae, caulis secundariis abbreviatis vaginatis unifoliatis, foliis mediocribus papyraceis oblonge ellipticis, obtusiusculis, apice minute triapiculatis, basi cuneatis, petiolatis, racemo e' ongato, quam folium longiore vel breviore, paucifloro, floribus successivis, uno simul aperto, parvis, roseo-albidis excepto labello rubropurpureo, pedunculo tenui, sepalis oblonge ovatis acutissimis, leviter concavis, latera libris liberis, petalis triangularibus falcatis, quam sepala paulo brevioribus et angustioribus, acutissimis, labello oblonge ovato subobtuso carnoso convexo, medio longitudinaliter sulcato, columna brevi antice expansa.

P antas pequeñas, cespitosas, epífitas. Tallos secundarios abreviados, de 0.5-1 cm. de longitud, cubiertos por 2-3 vainas, unifoliados. Hoja papirácea oblongamente elíptica, un poco obtusa, con ápice diminutamente triapiculado, con la base cuneada, con pecíolo acanalado, de hasta 8 cm. de longitud, incluído e' pecíolo, y hasta 11 mm. de anchura. Inflorescencia en racimo paucifloro alargado, más corto o más largo que la hoja, de hasta 7 cm. de longitud; pedúnculo delgado, con 2-3 vainas agudas, distantes, de 2.3 mm. de longitud; brácteas florales agudas, de 2.3 mm. de longitud, pedicelos de 3-5 mm. de longitud, ovario de 1.5 mm. de longitud. Flores de color blanco-rosado, excepto el labelo rojomorado. Sépalos oblongo-ovados, muy agudos, algo cóncavos de 6.7 mm. de longitud y 1-1.5 mm. de anchura, los laterales libres; pétalos oblongo-triangulares, ligeramente falcados, muy agudos, de 5.6 mm. de longitud y 0.5 mm. de anchura; labelo oblongo-ovado, subobtuso, carnoso, convexo, algo erecto, microscópicamente papiloso, con un surco longitudinal en el medio, de 3.5-4.5 mm. de longitud y 1-1.5 mm. de anchura. Columna corta, ensanchada apicalmente, con estigma frontal; polinios 2.

ETIMOLOGIA: Del griego **orektos**: "extendido" y **glossa** "lengua" (labelo), por la forma y posición del labelo.



***Platyscole orectoglossa* P. Ortiz**

TIPO: **COLOMBIA:** ANTIOQUIA; Yarumal, Briceño, "El Oro", alt. 1750 m., recol. O. J. Arango, R. Escobar y W. Teague, 3 ene. 1974, R. Escobar 1053 (HOLO-TIPO: COL).

DISTRIBUCION: Colombia, Cordillera Central.

Esta especie es afín de *Pl. misera* (Lindl.) Garay, pero se diferencia de ella por su inflorescencia más corta, menos densa, con una sola flor abierta ordinariamente, y la forma de los segmentos florales; es especialmente notable su labelo bastante grande y erecto.