

264. **Pleurothallis oxyglossa** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, perpusilla, caespitosa, 1,5—3 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris; caulis valde abbreviatis vagina hyalina omnino obtectis; folio erecto vel suberecto, oblanceolato vel obovato, obtuso, marginato, basi in petiolum sensim angustato, petiolo inclusu 1—1,5 cm longo, medio laminae 0,2—0,4 cm lato; racemis gracillimis, erecto-patentibus, vulgo paulo arcuatis, folia duplo vel plus duplo superantibus, laxe plurifloris, pedunculo setiformi vulgo folio aequilongo vel longiore, pedicellis arcuato-patentibus, tenuissimis; bracteis minutis, apiculatis, pedicello multoties brevioribus; floribus in genere inter minimos, illos *P. microtatantae* Schltr. in mentem revocantibus; sepalis lanceolatis, longe acuminatis, glabris, 2,5 mm longis, lateralibus paulo obliquis; sepalis anguste et oblique lineari-lanceolatis, acutissimis, 1,50 mm longis, glabris; labello brevissime unguiculato ovato-lanceolato, acutissimo, glabro, petalis fere aequilongo; columna brevissima, crassiuscula, subapoda, glabra; ovario cum pedicello filiformi 2,5—3 mm longo, glabro.

Guatemala: Epiphytisch im Hochwald bei Coban, c. 1500 m ü. d. M.—H. v. Türkheim no. II, 2422a (vermischt mit *P. scopula* Schltr.), blühend im Februar 1908.

Habituell gleicht die Art sehr der *P. microtatantae* Schltr., ist aber in den Blüten ganz verschieden. In der Blütenkonstruktion kommt sie der *P. pedicularis* Schltr. wohl am nächsten.