

184. **Pleurothallis Wercklei** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, caespitifica, 7—15 cm alta; rhizomate abbreviato; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris; caulibus secundariis, biarticulatis, vaginis 2 alte vaginantibus primum obtectis, 1,5—4 cm longis; folio erecto oblanceolato-ligulato, obtuso, basi subpetiolato, glabro, textura carnosio, 4—10 cm longo, supra medium 0,5—0,8 cm lato; racemis terminalibus, secundifloris, vulgo foliis fere aequilongis, singulis, laxe 4—8-floris; spatha basilari parvula, vix 0,3 cm longitudine excedente; pedunculo gracili, racemo ipso fere aequilongo, glabro, vaginulis paucis dissitis obsesso; bracteis ovato-cucullatis, breviter acuminatis, ovario pedicellato fere duplo brevioribus; floribus in genere mediocribus, ut videtur brunneo-striatis; sepalo intermedio lanceolato, subacuto, trinervi, extus glabro, intus margines versus pilosulo, 0,8 cm longo, sepalis lateralibus usque infra apicem in foliolum lanceolato-ellipticum, marginibus intus pilosulum, apice bifidum cohaerentibus, sepalo intermedio aequilongis; petalis ligulatis breviter acuminatis, glabris, 3,5 mm longis; labello e basi breviter cuneata trilobo, lobis lateralibus anguste falcato-lanceolatis acutis, erectis, tenuibus, intermedio carnosio, linguiformi obtuso, subtus bicostato, labello toto 3,5 mm longo, lobo intermedio 2,5 mm longo; columna gracili, 3 mm longa, clinandrio lacerato; ovario incurvo, clavato, pedicello incluso, 0,8 cm longo.

Costa-Rica: Ohne genaue Standortsangabe. — Ch. Wercklé (com. K. Schumann, 1903).

Eine Art der Sektion *Elongatae*, die sich durch die spitzen sichelförmigen Seitenlappen des Labellums auszeichnet.