

64. **Epidendrum abbreviatum** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, erectum, 15–20 cm altum; radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; pseudobulbis subfusiformi-cylindraceutis apice bifoliatis, 4–5 cm longis, medio fere 0,4–0,5 cm diametentibus; foliis lineari-ligulatis obtusis, glabris, textura coriaceis, erectis vel erecto-patentibus, 11,5–14 cm longis, medio fere 0,6–0,8 cm latis; racemo abbreviato, densius 3–6-floro, basi vaginis 2 amplectentibus brevibus donato; bracteis erecto-patentibus deltoideis acutis, ovario brevioribus; floribus erecto-patentibus illis *E. coriacei* Hk. fere aequimagnis; sepalis oblongo-ligulatis, glabris, textura crassiusculis, c. 1 cm longis, intermedio acuto, lateralibus obliquis apice breviter acuminatis; petalis textura sepalis aequalibus aequilongisque oblique spathulatis, breviter acuminatis; labello crassiusculo ungue brevi columnae adnato, lamina suborbiculari acuminata, margine paulo undulata, c. 0,7 cm diametiente, basi callo oblongo depresso in unguem decrescente medium laminae subattingente ornato, caeterum nudo; columna crassiuscula apicem versus paululo ampliata, clinandrio trilobulato, lobulis apiculatis, intermedio lateralibus paulo majore; capsula trialata oblonga.

Costa-Rica: Ohne Nummer und nähere Standortsangabe — H. Pittier u. A. Tonduz.

In der Sektion *Osmophytum* ist die vorliegende Art durch die schlanken Bulben und die auffallend stark verkürzten Infloreszenzen ausgezeichnet.