

66. **Epidendrum Henrici** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum in arboribus, erectum, 20—30 cm altum; rhizomate decumbente tereti, pseudobulbis laxe obsesso; pseudobulbis fusiformibus lateraliter paulo compressis, apice bifoliatis, 8—11 cm altis, infra medium 8—1,2 cm latis; foliis erecto-patentibus ligulatis, subacutis, glabris, tex-tura coriaceis, 14—20 cm longis, 1—1,5 cm latis; racemis laxe 4—7-floris, foliis vulgo brevioribus, pedunculo paulo compresso, basi vaginis paucis donato; bracteis minutis deltoideis; floribus mediocribus illis *E. Boothianae* Ldl. fere aequimagnis; sepalis carnosis anguste oblongo-ligulatis acutis, glabris, 1,1 cm longis, lateralibus paulo obliquis; petalis e basi ligulata subspathulatis obtusiusculis, obliquis, sepalis subaequilongis, textura aequalibus; labello oblongo-spathulato obtuso, exunguiculato, margine dimidio anteriore undulato-crenato, textura carnoso, 1 cm longo, infra apicem 0,5 cm lato, callo linearie obtuso apice sparsim piloso e basi usque ad medium labelli decurrente, verrucis sparsis antepositis; columna crassa basi antice leviter excavata, clinandrio dorso lobo oblongo obtuso ornata; anthera cucullata obtusissima; ovario breviter pedicellato, clavato, triangulari, 1,2 cm longo; capsula trialata.

Costa-Rica: Auf Bäumen bei San José, blühend im März und Juli — Henri Pittier no. 2176; Ad. Tonduz no. 8204.

Die Pflanze zeichnet sich unter allen Arten der Sektion *Osmophytum* durch das Labellum aus. Die Blüten sind gelblich. Hierher gehören auch die no. 1010 und 7886 der Pittierschen Sammlungen.