

**Restrepia** H. B. et Kth.

**Restrepia angustilabia** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, interdum superposita, 7,5—9 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulinis teretiusculis, 3,5—4 cm longis, vaginis c. 4 compressis, acutis, pallidis, immaculatis omnino obtectis, interdum superpositis, superioribus minoribus; folio elliptico, obtusiusculo, apice ipso sub lente minute 3-dentato, basi in petiolum perbrevem, c. 4 mm longum contracto, 3,7—5 cm longo, medio fere 1—1,5 cm lato, carnosò-coriaceo; inflorescentiis folium vulgo paulo excedentibus, 1—2-nis, pedunculo gracillimò, basi paucivaginulato, caeterum nudo, folium fere aequante vel paulo superante; bractea elliptica, acuminata, pedicellum ovarii paulo excedente; flore erecto-patente, in sectione inter minores, glabro; sepalo intermedio erecto, è basi lanceolata 5-nervia tentaculato-producto, 1,3 cm longo, lateralibus aequilongis, in laminam oblongam. apice breviter et obtusiuscule bilobulatam cohaerentibus; petalis e basi oblique et anguste lanceolata, 3-nervia tentaculato-productis, 7 mm longis; labello basi suborbiculari, marginibus incurvis bieirhoso, in sexta parte basili constricto et in laminam anguste ligulatam obtusiusculam, margine irregularem, 3-nerviam producto, toto c. 7,5 mm longo, supra basin 1,5 mm lato, lamina medio c. 0,75 mm lata; columna gracili generis, c. 4 mm longa; ovario cum pedicello duplo longiore c. 5 mm longo.

Costa Rica: Umgebung von San Ramon — G. Acosta, im Jahre 1921.

Diese und die folgende Art sind die ersten aus Zentralamerika bekanntgewordenen der Sektion *Eurestrepia*. Beide zeichnen sich durch verhältnismäßig kleine Blüten aus.

Von der folgenden ist *R. angustilabia* Schltr. durch die ganzrandigen Petalen, die schmälere, vorn stumpfliche Lippe und deren Form gut unterschieden.