

**Sarcoglossis** Presl.

**S. Hunteriana<sup>1)</sup>** Schltr., nov. spec.

Terrestris, erecta, 45—50 cm alta; foliis radicalibus rosulatis, ellipticis, acuminatis, basin versus sensim in petiolum latum usque ad 7 cm longum angustatis, viridibus, longitudinaliter albido-fasciat, lamina 15—17 cm longa, medio fere 5—7 cm lata, scapo erecto, stricto, vaginis c. 6—7 acuminatissimis, amplectentibus distanter obsesso, apicem versus glandulosopuberulo, tereti, supra basin usque ad 6 mm diametente; racemo erecto, 4—7-floro, usque ad 15 cm longo; bracteis erecto-patentibus, anguste lanceolatis, acuminatissimis, inferioribus ovarium excedentibus, superioribus sensim paulo minoribus; floribus viridibus, in genere inter magnos, extus breviter glandulosopuberulis, erecto-patentibus vel suberectis; sepalo intermedio ligulato, obtuso, extus basi glandulosopuberulo, c. 2,5 cm longo, lateralibus oblongo-falcatis, obtusis, extus basi glandulosopuberulis, 3,2 cm longis, basi margine anteriore producta cum pede columnae cuniculum ovario subaequilongum formantibus; petalis sepalo intermedio paulo longiori margine interiore agglutinatis, e basi linearis dimidio superiore paulo dilatatis, obtusis, glabris; labello e ungue brevi oblongo-ligulato, supra medium paulo dilatato, tertia parte anteriore in laminam ovato-suborbicularis, dicurvam, obtusam, marginibus leviter undulatam, 8 mm longam, medio 7 mm latam dilatato, basi latere utrinque auriculo vel dente retrorso, subulato carnosulo donato, labello toto c. 3,3 cm longo, supra medium 5,8 mm lato, versus basin marginibus praeserim lanuginoso-piloso; columna generis satis gracilis, antice puberula, dorso sepalo intermedio altius adnata, pede elongato; ovario fusiformi-cylindraceo, glandulosopuberulo, 2,5—2,7 cm longo.

Panama: In Tälern zwischen Hügeln bei Panama-City — no. 147.

Diese und die folgende Art, welche beide mit *S. picta* Kl. verwandt sind aber sich durch die Lippenform gut unterscheiden, stehen einander sehr nahe, sind aber leicht dadurch zu erkennen, daß bei *S. Hunteriana* Schltr. die Blätter durch weiße Längsbänder geschmückt, während sie bei *S. Powellii* Schltr. einfach weiß getüpfelt sind. Auf die Unterschiede in den Blüten gehe ich bei der Beschreibung der *S. Powellii* Schltr. näher ein.

<sup>1)</sup> Die Art ist dem Freunde Mr. Powells Mr. Hunter gewidmet, der sich oft an den Sammelexkursionen beteiligte.