

376. **Scaphosepalum elasmatopus** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, parvulum, 10—18 cm altum; rhizomate breviter repente; radicibus filiformibus, glabris; caulibus valde abbreviatis, unifoliatis; folio erecto, falcato-ob lanceolato, obtusiusculo, sensim in petiolum satis longum attenuato, glabro, petiolo incluso 7—15 cm longo, supra medium 0,8—1,4 cm lato; scapis adscendentibus, gracillimis, rigidulis, paucivaginulatis, folia rarius paulo excedentibus; racemo disticho, sublaxe pluri-vel multifloro sensim elongato, usque ad 6 cm longo; bracteis compressis, acuminatis, pedicello vulgo aequilongis; floribus succedaneis in genere interminores; sepalis oblongis, glabris, intermedio 8 mm longo, apicem versus paulo incrassato obtusiusculo, lateralibus obliquis, usque ad tertiam partem apicalem connatis, 9,5 mm longis, extus nervo intermedio altius costatis, apicibus liberis acutis, divergentibus; petalis oblique oblongo-ligulatis, apiculatis, glabris, 3,5 mm longis; labello e ungue lineari medio calloso-dilatato, antice paulo angustiore, oblongo, obtuso, margine minute serrulato-inciso, 3 mm longo; columna gracili supra medium dilatata, 2,75 mm longa; ovario cum pedicello glabro, c. 3,5 mm longo.

Panama: An Baumstämmen in feuchten Wäldern zwischen Alto de las Palmas und dem Gipfel des Cerro de Horqueta (Chiriqui), 2100—2268 m ü. d. M. — H. Pittier & W. R. Maxon (B. S. P. C. Z. no. 3229, 5484, 5730), blühend im März 1911.

Die Art steht dem *S. Pittieri* Schltr. von Costa-Rica am nächsten,