

102. **Stelis despectans** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, pusillum, caespitosum; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus elongatis, flexuosis, glabris; caulibus gracilibus teretibus, glabris, vaginis 2 alte amplexantibus obsessis, apice unifoliatis, 2,3—5 cm longis; folio erecto anguste oblongo-ligulato, breviter apiculato, glabro, textura coriaceo, basi in petiolum brevem angustato; petiolo incluso 4—7 cm longo, medio fere 0,3—0,5 cm lato; spicis secundis folium paulo excedentibus, laxe multifloris; pedunculo petiolo fere aequilonga, vaginulis paucis dissitis, donato; bracteis ovato-cucullatis, acuminatis, ovarium paulo superantibus; floribus despectantibus in genere vix inter mediocres; sepalo intermedio oblongo-ligulato obtuso, quarta parte basilari cum sepalis connato, utrinque glabro, 0,3 cm longo, laterali-bus oblongis obtusis glabris, tertia parte basilari inter se connatis, 0,2 cm longis; petalis minutis oblique ovatis obtusis, glabris; labello carnosulo, circuitu ovato obtuso, glabro, obscure trilobulato, medio excavato; columna brevi, brachiis adscendentibus, falcato-lanceolatis acutis, antheram paululo superantibus; anthera ovato-cucullata, glabra; pollinibus oblique pyriformibus basi acutis; ovario sessili cylindraceo, glabro, vix 0,2 cm longo.

Costa Rica: Bei Las Palmas, c. 1500 m. — H. Pittier no. 594, blühend im Juli 1888.